

**ТЕРМОДИНАМІКА ВЗАЄМОДІЇ СПОЛУК НІКЕЛЮ
З ОКИСНИКАМИ ТА ВІДНОВНИКАМИ У РОЗЧИНАХ**
Гринь Г.І., Семенов Є.О., Степанчук А.С., Полянський Я.І.
*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків*

У роботі проведено теоретичні термодинамічні дослідження взаємодії сполук нікелю з різними окиснювачами та відновниками, обрано найбільш доцільний окиснювач для процесу осадження сполук нікелю.

У даний час при виробництві хімічної продукції утворюється велика кількість відходів. Серед них особливо небезпечними є стічні води, що містять сполуки важких металів, таких як нікель. Такі відходи є токсичними та, після переробки, можуть використовуватися в якості сировини. Створення технології очищення рідких відходів від сполук нікелю дозволить не тільки значно поліпшити екологічну ситуацію, але і повернути цінний хімічний компонент.

Основними методами утилізації сполук нікелю на теперішній час є фізичні, сорбційні, електрохімічні, використання цементації, осадження фосфатами, осадження сірковмісними реагентами, осадження карбонатами, осадження гідроксидами.

Найефективнішим і найдоцільнішим є осадження нікелю в лужному середовищі в присутності окиснювача.

Найбільш відомими та розповсюдженими окиснювачами та відновниками для осадження нікелю з розчину є HCOOH , HCOH , H_2 , CH_4 , CO , KMnO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, NaClO , FeCl_3 , Cl_2 , O_3 , O_2 , H_2O_2 .

Проведення теоретичного термодинамічного дослідження дозволило зробити такі висновки:

1. При взаємодії сполук нікелю з HCOOH , HCOH , H_2 , CH_4 , CO , NaClO виділення металу термодинамічно неможливо, тому використання даних відновників недоцільно.

2. При використанні в якості окиснювачів KMnO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ і O_3 термодинамічно можливо окислення нікелю до Ni_3O_4 , Ni_2O_3 .

3. Використання $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ і FeCl_3 в якості окиснювачів недоцільно, так як відбувається внесення в розчин додаткової кількості іонів хрому або заліза.

4. Використання в якості окиснювача газоподібного хлору недоцільно, так як він має високу токсичність і корозійну активність.

5. Найбільш доцільне використання в якості окиснювача H_2O_2 .

Таким чином, проведені теоретичні термодинамічні дослідження показали можливість взаємодії сполук нікелю з різними відновниками та окиснювачами. Визначено, що застосування H_2O_2 забезпечує найкращі показники за рахунок стабільного осадження та більш високої швидкості окиснення.